


ACTIVIDADES-PÁG. 132

1. Las soluciones de las ecuaciones dadas son:

$$a) x^2 - 4x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 2 + i \text{ y } x_2 = 2 - i$$

$$b) 2x^3 + 32x = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \text{ y } x_2 = 4i \text{ y } x_3 = -4i$$

2. El vector resultante de girar 90° el vector $\vec{v}(4, 3)$ es el vector $\vec{u}(-3, 4)$. Puede verse en el dibujo.




3. Los puntos de intersección de la hipérbola con las rectas vienen dados por los sistemas que siguen:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{No tiene soluciones. Por tanto, no hay puntos de corte.}$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -3; y_1 = 0 \\ x_2 = 3; y_2 = 0 \end{cases} \text{ Los puntos de corte son P } (-3, 0) \text{ y Q } (3, 0).$$

$$\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \\ y = \frac{4}{3}x \end{cases} \Rightarrow \text{No tiene soluciones. Por tanto, no hay puntos de corte.}$$

Todo lo anterior puede verse en el dibujo.




4. El radio del hexágono mide $2\sqrt{2}$, su apotema mide $\sqrt{6}$ y el área será:

$$\frac{6 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{6}}{2} = 12\sqrt{3} u^2.$$

ACTIVIDADES-PÁG. 147

1. Si cada punto representa una lámpara, la solución quedaría del siguiente modo:



2. Si hay n calles, el número máximo de cruces es $C_{n,2} = \frac{n^2 - n}{2}$.

Luego si hay 66 farolas habrá 66 cruces y se cumplirá:

$$\frac{n^2 - n}{2} = 66 \Rightarrow n^2 - n - 132 = 0 \Rightarrow n = 12$$

El pueblo tenía 12 calles como mínimo.

3. Ésta es una de las disposiciones en que quedó la cava.

Cómo máximo pudo robar:

$$60 - 42 = 18 \text{ botellas.}$$

La disposición de 42 botellas admite muchas formas diferentes,

1		20
20		1

ACTIVIDADES-PÁG. 148

1. Los resultados en cada uno de los apartados son:


a) $z^4 = (-4\sqrt{3} + 4i)^4 = -2048 - 2048\sqrt{3}i = 4096 \frac{-2\pi}{3}$

b) $i^{193} \cdot (-2) \cdot (-4\sqrt{3} + 4i)^6 = 524288i = 524288 \frac{\pi}{2}$

c) inverso de $z = \frac{1}{(-4\sqrt{3} + 4i)} = -\frac{\sqrt{3}}{16} - \frac{i}{16} = \left(\frac{1}{8}\right) \frac{-5\pi}{6}$


d) Para hallar $\sqrt[3]{z}$ resolvemos la ecuación $z^3 = -4\sqrt{3} + 4i$ y obtenemos las tres soluciones de esta ecuación como vemos en la imagen.

En la imagen tenemos la resolución, con Wiris, de esta actividad.



2. Con Wiris resolvemos la ecuación y como vemos en la imagen obtenemos las cinco soluciones de la misma.

Sus afijos son los vértices de un pentágono regular cuyo dibujo tenemos en la misma imagen y cuya área se calcula con el comando **área(polígono)** y en este caso vale 9,5106 unidades cuadradas.



ACTIVIDADES-PÁG. 149

1. Los resultados de las operaciones son:

a) $5z_1 - \sqrt{3}z_2 = -5,20 - 4i$

b) $z_1^3 \cdot z_2^4 = -997.66 - 3384i$

c) el inverso de $(z_1 \cdot z_2) = -0,08 + 0.07i$

2. El complejo $2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}i$ en forma polar es $4 \cdot \frac{\pi}{4}$ y el complejo $5 \cdot \frac{4\pi}{3}$ en forma binómica es

$$\frac{-5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i$$

ACTIVIDADES-PÁG. 150

1. Las soluciones de las operaciones son:

a) $(-3 + 2i) + (4 - 3i) = 1 - i$

c) $(-2 + 3i) - (3 - 4i) = -5 + 7i$

e) $3i - (-6 + 2i) = 6 + i$

b) $(1 + 5i) + (2 - 2i) = 3 + 3i$

d) $(3 - 7i) - (-2 + 2i) = 5 - 9i$

f) $5 + (-2 + i) = 3 + i$

2. Las soluciones de las operaciones son:

a) $(3 + 2i) \cdot (-2 + 4i) = -14 + 8i$

c) $(2 + i) \cdot (-2 - i) = -3 - 4i$

e) $(1 - 3i) \cdot (1 + 3i) = 10$

b) $\frac{2 + 5i}{3 - 4i} = -\frac{14}{25} + \frac{23}{25}i$

d) $\frac{1 - 3i}{1 + 3i} = -\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

f) $\frac{-1 + 5i}{-3 + i} = \frac{4}{5} - \frac{7}{5}i$

3. La tabla completa:

Complejo	Opuesto	Conjugado	Inverso
$5 + i$	$-5 - i$	$5 - i$	$\frac{5}{26} - \frac{1}{26}i$
$-1 + i$	$1 - i$	$-1 - i$	$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$
$2 + 2i$	$-2 - 2i$	$2 - 2i$	$\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$
$1 - 3i$	$-1 + 3i$	$1 - 3i$	$\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i$

4. Las soluciones de las operaciones son:

a) $u^2 = -7 - 24i$

c) $(u - v)^2 = 8 - 6i$

b) $w^3 = -2 - 2i$

d) $\frac{(u + v)^3}{w^2} = -77 - 207i$

5. El valor de las expresiones es:

a) $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{20} = 0$

d) $\frac{(3 + 2i) \cdot i^{17}}{i^{243} \cdot (1 - i^7)} = -\frac{5}{2} + \frac{1}{2}i$

b) $\frac{i^{298}}{i^{481} - i^{275}} = \frac{1}{2}i$

e) $i^{-1} + i^{-2} + i^{-3} \dots + i^{-40} = 0$

c) $1 + i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2000} = 1$

f) $\frac{(2 - i) \cdot (3 + 2i)^2}{(1 + i^{12}) \cdot i^{120}} = 11 + \frac{19}{2}i$

6. Las respuestas a las cuestiones son:

a) Operamos $(2 + bi)^2 = (4 - b^2) + 4bi$. Como tiene que ser real se cumplirá:
 $4b = 0$, entonces $b = 0$.

b) Operamos $(3 + 2i) \cdot (-5 + bi) = (-15 - 2b) + (3b - 10)i$. Como el afijo tiene que estar en la bisectriz del primero y tercer cuadrante se cumplirá:
 $-15 - 2b = 3b - 10 \Rightarrow b = -1$

c) Operamos y obtenemos:

$$(a + 3i) \cdot (2 - bi) = 23 - 14i \Rightarrow \begin{cases} 2a + 3b = 23 \\ 6 - ab = -14 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 3b = 23 \\ ab = 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 4, b_1 = 5 \\ a_2 = \frac{15}{2}, b_2 = \frac{8}{3} \end{cases}$$

Hay dos soluciones, los complejos $4 + 5i$ y $\frac{15}{2} + \frac{8}{3}i$.

d) Operamos $\frac{4 + 2ai}{3a + i} = \frac{(4 + 2ai)(3a - i)}{(3a + i)(3a - i)} = \frac{14a}{9a^2 + 1} + \frac{6a^2 - 4}{9a^2 + 1}i$. Como tiene que ser un número imaginario puro se cumplirá:


$$\frac{14a}{9a^2 + 1} = 0, \text{ entonces } a = 0.$$

7. La tabla queda del siguiente modo:

Afijo	Forma binómica	Forma polar	Forma trigonométrica
(2, 2)	$2 + 2i$	$(2\sqrt{2})_{45^\circ}$	$2\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$
(1, -1)	$1 - i$	$\sqrt{2}_{315^\circ}$	$\sqrt{2}(\cos 315^\circ + i \operatorname{sen} 315^\circ)$
$(2\sqrt{3}, 2)$	$2\sqrt{3} + 2i$	4_{30°	$4(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)$
$(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$	$-\sqrt{2} - \sqrt{2}i$	2_{225°	$2(\cos 225^\circ + i \operatorname{sen} 225^\circ)$

ACTIVIDADES-PÁG. 151

8. Las representaciones gráficas pueden verse a continuación:



9. Las soluciones son:

$$a) 2_{25^\circ} \cdot 3_{20^\circ} = 6_{45^\circ} = 6 \cdot (\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ) = 6 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$$

$$b) 16_{76^\circ} : 4_{46^\circ} = 4_{30^\circ} = 4 \cdot (\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ) = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2\sqrt{3} + 2i$$

$$c) 12_{93^\circ} : 3_{33^\circ} = 4_{60^\circ} = 4 \cdot (\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 + 2\sqrt{3}i$$

$$d) (1_{30^\circ})^3 = 1_{90^\circ} = 1 \cdot (\cos 90^\circ + i \operatorname{sen} 90^\circ) = 1 \cdot (0 + i) = i$$

$$e) (4_{225^\circ})^2 = 16_{90^\circ} = 16 \cdot (\cos 90^\circ + i \operatorname{sen} 90^\circ) = 16 \cdot (0 + i) = 16i$$

$$f) [6(\cos 130^\circ + i \operatorname{sen} 130^\circ)] \cdot [3(\cos 80^\circ + i \operatorname{sen} 80^\circ)] = 18 \cdot (\cos 210^\circ + i \operatorname{sen} 210^\circ) =$$

$$= 18 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = -9\sqrt{3} - 9i$$

$$g) [4(\cos 20^\circ + i \operatorname{sen} 20^\circ)]^3 = 4^3 \cdot (\cos 60^\circ + i \operatorname{sen} 60^\circ) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 32 + 32\sqrt{3}i$$

$$h) \frac{4(\cos 330^\circ + i \operatorname{sen} 330^\circ)}{2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)} = 2 \cdot (\cos 300^\circ + i \operatorname{sen} 300^\circ) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - \sqrt{3}i$$

10. Expresando los complejos a forma polar y operando, obtenemos:

$$a) (-1 - i)^7 \cdot (-2 + 2i)^5 = (\sqrt{2}_{225^\circ})^7 \cdot (\sqrt{8}_{135^\circ})^5 = 2^{11}_{7 \cdot 225^\circ + 5 \cdot 135^\circ} = 2^{11}_{2250^\circ} = 2048_{90^\circ}$$

$$b) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \right)^{20} = (1_{330^\circ})^{20} = 1_{20 \cdot 330^\circ} = 1_{6600^\circ} = 1_{120^\circ}$$

$$c) (i^8 + i^5) : \sqrt{2}i = \frac{i^8 + i^5}{\sqrt{2}i} = \frac{1 + i}{\sqrt{2}i} = \frac{\sqrt{2}_{45^\circ}}{\sqrt{2}_{90^\circ}} = 1_{315^\circ}$$

$$d) \left(\frac{4 - 4\sqrt{3}i}{\sqrt{3} + i} \right)^6 = \left(\frac{8_{300^\circ}}{2_{30^\circ}} \right)^6 = (4_{270^\circ})^6 = 4^6_{6 \cdot 270^\circ} = 4096_{180^\circ}$$

$$e) i^{39} \cdot (-4 - 4\sqrt{3}i)^7 = 1_{270^\circ} \cdot (8_{240^\circ})^7 = 8^7_{1950^\circ} = 8^7_{150^\circ}$$

$$f) i^{-73} \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2}i \right) = 1_{270^\circ} \cdot 3_{330^\circ} = 3_{600^\circ} = 3_{240^\circ}$$

11. En el cálculo de las raíces obtenemos:

$$a) \sqrt[3]{i} = \sqrt[3]{1_{90^\circ}} = 1_{\frac{90^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 1_{30^\circ + 120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2. \text{ Las raíces son: } 1_{30^\circ}; 1_{150^\circ} \text{ y } 1_{270^\circ}.$$

$$b) \sqrt{\frac{9}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{2}i} = \sqrt{9_{60^\circ}} = 3_{\frac{60^\circ + 360^\circ \cdot k}{2}} = 3_{30^\circ + 180^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0 \text{ y } 1. \text{ Las raíces son } 3_{30^\circ} \text{ y } 3_{210^\circ}.$$

$$c) \sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{27_{180^\circ}} = 3_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 3_{60^\circ + 120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2. \text{ Las raíces son } 3_{60^\circ}; 3_{180^\circ} \text{ y } 3_{300^\circ}$$

$$d) \sqrt[5]{\frac{-32}{i}} = \sqrt[5]{32i} = \sqrt[5]{32}_{90^\circ} = \frac{2_{90^\circ + 360^\circ \cdot k}}{5} = 2_{18^\circ + 72^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1; 2; 3 \text{ y } 4.$$

Las raíces son: 2_{18° ; 2_{90° ; 2_{162° ; 2_{234° y 2_{306°

$$e) \sqrt[3]{1-i} = \sqrt[3]{\sqrt{2}_{315^\circ}} = \sqrt[6]{2}_{\frac{315^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = \sqrt[6]{2}_{105^\circ + 120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2$$

Las raíces son: $\sqrt[6]{2}_{105^\circ}$; $\sqrt[6]{2}_{225^\circ}$ y $\sqrt[6]{2}_{345^\circ}$.

$$f) \sqrt[3]{\frac{1-i}{1+i}} = \sqrt[3]{-i} = \sqrt[3]{1}_{270^\circ} = \frac{1_{270^\circ + 360^\circ \cdot k}}{3} = 1_{90^\circ + 120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2$$

Las raíces son: 1_{90° ; 1_{210° y 1_{330°

$$g) \sqrt[4]{1+i} = \sqrt[4]{\sqrt{2}_{45^\circ}} = \sqrt[8]{2}_{\frac{45^\circ + 360^\circ \cdot k}{4}} = \sqrt[8]{2}_{11^\circ 15' + 90^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1; 2 \text{ y } 3.$$

Las raíces son: $\sqrt[8]{2}_{11^\circ 15'}$; $\sqrt[8]{2}_{101^\circ 15'}$; $\sqrt[8]{2}_{191^\circ 15'}$ y $\sqrt[8]{2}_{281^\circ 15'}$.

$$h) \sqrt[4]{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i} = \sqrt[4]{1}_{150^\circ} = \frac{1_{150^\circ + 360^\circ \cdot k}}{4}; \text{ con } k = 0; 1; 2 \text{ y } 3.$$

Las raíces son: $1_{37,5^\circ}$; $1_{127,5^\circ}$; $1_{217,5^\circ}$; y $1_{307,5^\circ}$

$$i) \sqrt[6]{i} = \sqrt[6]{1}_{90^\circ} = \frac{1_{90^\circ + 360^\circ \cdot k}}{6} = 1_{15^\circ + 60^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1; 2; 3; 4 \text{ y } 5.$$

Las raíces son: 1_{15° ; 1_{75° ; 1_{135° ; 1_{195° ; 1_{255° y 1_{315°

$$j) \sqrt[3]{\frac{i^5 - i^{-5}}{2i}} = \sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1}_{0^\circ} = \frac{1_{0^\circ + 360^\circ \cdot k}}{3} = 1_{120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2.$$


Las raíces son: 1_{0° ; 1_{120° y 1_{240° .

12. El cálculo de las raíces se describe a continuación y la representación gráfica puede verse en los dibujos.

$$a) \sqrt[6]{1} = \sqrt[6]{1}_{0^\circ} = \frac{1_{0^\circ + 360^\circ \cdot k}}{6} = 1_{60^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1; 2; 3; 4 \text{ y } 5.$$

Las soluciones son: 1_{0° ; 1_{60° ; 1_{120° ; 1_{180° ; 1_{240° y 1_{300°


Gráficamente obtenemos los vértices de un hexágono regular centrado en el origen de coordenadas.



b) $\sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1_{180^\circ}} = 1_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 1_{60^\circ + 120^\circ \cdot k}$; con $k = 0; 1$ y 2 .

Las soluciones son: 1_{60° ; 1_{180° y 1_{300° .


Gráficamente obtenemos los vértices de un triángulo equilátero centrado en el origen de coordenadas.



c) $\sqrt[4]{16i} = \sqrt[4]{16_{90^\circ}} = 2_{\frac{90^\circ + 360^\circ \cdot k}{4}} = 2_{22,5^\circ + 90^\circ \cdot k}$; con $k = 0; 1; 2$ y 3 .

Las soluciones son: $2_{22,5^\circ}$; $2_{112,5^\circ}$; $2_{202,5^\circ}$ y $2_{292,5^\circ}$


Gráficamente obtenemos los vértices de un cuadrado centrado en el origen de coordenadas.



d) $\sqrt[5]{-32} = \sqrt[5]{32_{180^\circ}} = 2_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{5}} = 2_{22,5^\circ + 90^\circ \cdot k}$; con $k = 0; 1; 2; 3$ y 4 .

Las soluciones son: 2_{36° ; 2_{108° ; 2_{180° ; 2_{252° y 2_{324°


Gráficamente obtenemos los vértices de un pentágono regular centrado en el origen de coordenadas.



$$e) \sqrt[3]{-27i} = \sqrt[3]{27}_{270^\circ} = 3_{\frac{270^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 1_{90^\circ + 120^\circ \cdot k}; \text{ con } k = 0; 1 \text{ y } 2.$$

Las soluciones son: 3_{90° ; 3_{210° y 3_{330° .

Gráficamente obtenemos los vértices de un triángulo equilátero centrado en el origen de coordenadas.



13. Sustituyendo en la ecuación original cada una de las raíces, operamos y obtenemos:

$$a) (2 + 3i)^2 - 8 \cdot (2 + 3i) + 13 = (-5 + 12i) - (8 + 12i) + 13 = (-5 - 8 + 13) + (12 - 12)i = 0$$

$$(2 - 3i)^2 - 8 \cdot (2 - 3i) + 13 = (-5 - 12i) - (8 - 12i) + 13 = (-5 - 8 + 13) + (-12 + 12)i = 0$$

$$b) (2 + 3i)^3 - 3 \cdot (2 + 3i)^2 + 9 \cdot (2 + 3i) + 13 = (-46 + 9i) - (-15 + 36i) + (18 + 27i) + 13 = (-46 + 15 + 18 + 13) + (9 - 36 + 27)i = 0$$

$$(2 - 3i)^3 - 3 \cdot (2 - 3i)^2 + 9 \cdot (2 - 3i) + 13 = (-46 - 9i) - (-15 - 36i) + (18 - 27i) + 13 = (-46 + 15 + 18 + 13) + (-9 + 36 - 27)i = 0$$

14. Toda ecuación de segundo grado se puede construir del siguiente modo a partir de sus soluciones:

$$z^2 - S \cdot z + P = 0$$

siendo S la suma de sus soluciones y P el producto.

$$a) \begin{cases} S = i + (-i) = 0 \\ P = i \cdot (-i) = -i^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow z^2 + 1 = 0$$

$$b) \begin{cases} S = (2 + 2i) + (2 - 2i) = 4 \\ P = (2 + 2i) \cdot (2 - 2i) = 8 \end{cases} \Rightarrow z^2 - 4z + 8 = 0$$

$$c) \begin{cases} S = (2 + 3i) + (2 - 3i) = 4 \\ P = (2 + 3i) \cdot (2 - 3i) = 13 \end{cases} \Rightarrow z^2 - 4z + 13 = 0$$

$$d) \begin{cases} 2_{45^\circ} = \sqrt{2} + \sqrt{2}i \\ 2_{315^\circ} = \sqrt{2} - \sqrt{2}i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S = (\sqrt{2} + \sqrt{2}i) + (\sqrt{2} - \sqrt{2}i) = 2\sqrt{2} \\ P = (\sqrt{2} + \sqrt{2}i) \cdot (\sqrt{2} - \sqrt{2}i) = 4 \end{cases} \Rightarrow z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$$

15. Las soluciones de las ecuaciones son:

$$a) z^2 + z + 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \Rightarrow \begin{cases} z_0 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{cases}$$

$$b) z^3 - 6z^2 + 10z - 8 = 0 \Rightarrow (z - 4) \cdot (z^2 - 2z + 2) = 0 \Rightarrow z_0 = 4; z_1 = 1 + i \text{ y } z_2 = 1 - i$$

$$c) z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z = \sqrt[4]{-1} = \sqrt[4]{1_{180^\circ}} = 1_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{4}} = 1_{45^\circ + 90^\circ \cdot k} \text{ con } k = 0; 1; 2 \text{ y } 3.$$

Dando valores a k, obtenemos: $z_0 = 1_{45^\circ}$; $z_1 = 1_{135^\circ}$; $z_2 = 1_{225^\circ}$ y $z_3 = 1_{315^\circ}$.

$$d) z^5 + z^4 + z^3 + z^2 + z + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (z + 1) \cdot (z^4 + z^2 + 1) = 0 \Rightarrow z = -1; z^2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \equiv 1_{120^\circ}; z^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \equiv 1_{240^\circ}$$

Resolviendo las ecuaciones de segundo grado, obtenemos:

$$z_0 = 1_{180^\circ}; z_1 = 1_{60^\circ}; z_2 = 1_{240^\circ}; z_3 = 1_{120^\circ} \text{ y } z_4 = 1_{300^\circ}.$$

$$e) z^6 - 64 = 0 \Rightarrow z = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{64_{0^\circ}} = 2_{\frac{0^\circ + 360^\circ \cdot k}{6}} = 2_{60^\circ \cdot k} \text{ con } k = 0; 1; 2; 3; 4 \text{ y } 5.$$

Dando valores a k, obtenemos: $z_0 = 2_{0^\circ}$; $z_1 = 2_{60^\circ}$; $z_2 = 2_{120^\circ}$; $z_3 = 2_{240^\circ}$ y $z_5 = 2_{300^\circ}$.

$$f) z^4 + 81 = 0 \Rightarrow z = \sqrt[4]{-81} = \sqrt[4]{81_{180^\circ}} = 3_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{4}} = 3_{45^\circ + 90^\circ \cdot k} \text{ con } k = 0; 1; 2 \text{ y } 3.$$

Dando valores a k, obtenemos: $z_0 = 3_{45^\circ}$; $z_1 = 3_{135^\circ}$; $z_2 = 3_{225^\circ}$ y $z_3 = 3_{315^\circ}$.

16. Las soluciones de las ecuaciones son:

$$a) z^2 + z + 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = 1_{120^\circ} \\ z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = 1_{240^\circ} \end{cases}$$

$$b) z^2 - \sqrt{12}z + 4 = 0 \Rightarrow z = \frac{\sqrt{12} \pm \sqrt{12 - 16}}{2} = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2} = \sqrt{3} \pm i \Rightarrow \begin{cases} z_1 = \sqrt{3} + i = 2_{30^\circ} \\ z_2 = \sqrt{3} - i = 2_{330^\circ} \end{cases}$$

$$c) z^2 + iz + 2 = 0 \Rightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{i^2 - 8}}{2} = \frac{-i \pm \sqrt{-9}}{2} = \frac{-i \pm 3i}{2} \Rightarrow \begin{cases} z_1 = i = 1_{90^\circ} \\ z_2 = -2i = 2_{270^\circ} \end{cases}$$

$$d) z^6 - 28z^3 + 27 = 0 \Rightarrow z^3 = \frac{28 \pm \sqrt{784 - 108}}{2} = \frac{28 \pm 26}{2} = \begin{cases} z_1^3 = 27 \\ z_2^3 = 1 \end{cases}$$

Para cada una de las soluciones anteriores:

- $z^3 = 27 \Rightarrow z = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{27_{0^\circ}} = 3_{120^\circ \cdot k} \Rightarrow z_0 = 3_{0^\circ}; z_1 = 3_{120^\circ} \text{ y } z_2 = 3_{240^\circ}$

- $z^3 = 1 \Rightarrow z = \sqrt[3]{1} = \sqrt[3]{1_{0^\circ}} = 1_{120^\circ \cdot k} \Rightarrow z_0 = 1_{0^\circ}; z_1 = 1_{120^\circ} \text{ y } z_2 = 1_{240^\circ}$

$$e) z^3 + 1 = 0 \Rightarrow \sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{1_{180^\circ}} = 3_{\frac{180^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 1_{60^\circ + 120^\circ \cdot k} \Rightarrow z_0 = 1_{60^\circ}; z_1 = 1_{180^\circ} \text{ y } z_2 = 1_{300^\circ}$$

$$f) z^3 - 64i = 0 \Rightarrow \sqrt[3]{64i} = \sqrt[3]{64_{90^\circ}} = 4_{\frac{90^\circ + 360^\circ \cdot k}{3}} = 4_{30^\circ + 120^\circ \cdot k} \Rightarrow z_0 = 4_{30^\circ}; z_1 = 4_{150^\circ} \text{ y } z_2 = 4_{270^\circ}$$

17. Las demostraciones quedan:

- $(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^2 = (\cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha) + (2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha) i = \cos 2\alpha + i \operatorname{sen} 2\alpha \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha \\ \operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

- $(\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha)^4 = (\cos^4 \alpha + \operatorname{sen}^4 \alpha - 6 \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{sen}^2 \alpha) + (4 \operatorname{sen} \alpha \cos^3 \alpha - 4 \operatorname{sen}^3 \alpha \cdot \cos \alpha) i =$

$$= \cos 4\alpha + i \operatorname{sen} 4\alpha \Rightarrow \begin{cases} \cos 4\alpha = \cos^4 \alpha + \operatorname{sen}^4 \alpha - 6 \cos^2 \alpha \cdot \operatorname{sen}^2 \alpha \\ \operatorname{sen} 4\alpha = 4 \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos^3 \alpha - 4 \operatorname{sen}^3 \alpha \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

18. Las soluciones de las cuestiones son:

$$a) \begin{cases} (a + bi) + (c + di) = 5 - 3i \\ \frac{a + bi}{c - di} \text{ imaginario puro} \\ a = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + c = 5 \\ b + d = -3 \\ bd + 4c = 0 \\ a = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = -4 \\ c = 1 \\ d = 1 \end{cases} \text{ o } \begin{cases} a = 4 \\ b = 1 \\ c = 1 \\ d = -4 \end{cases}$$

Los números complejos son: $4 - 4i$ y $1 + i$ o bien $4 + i$ y $1 - 4i$.

b) Sea z el número complejo buscado. Se cumple: $\frac{1}{z} = -z$

De aquí obtenemos que $z^2 = -1$; $z = \pm i$.

c) Sea $z = a + bi \neq 0$. Se cumple: $z^2 = \bar{z}$.

De aquí obtenemos:

$$(a+bi)^2 = a-bi \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a^2 - b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases}$$

Resolviendo el sistema anterior obtenemos los números complejos:

$$z_1=1; z_2= -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i; z_3= -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

ACTIVIDADES-PÁG. 152

19. Queda:

$$\sqrt[3]{z} = 5i \quad \Rightarrow \quad z = 125i^3 \quad \Rightarrow \quad z = -125i$$

Las otras raíces son:

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{-125i} &= \sqrt[3]{125}_{270^\circ} = 5_{90^\circ + 120^\circ k} \quad \Rightarrow \\ \Rightarrow z_0 &= 5_{90^\circ} = 5i; \quad z_1 = 5_{210^\circ} = \frac{-5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2}i; \quad z_2 = 5_{330^\circ} = \frac{5\sqrt{3}}{2} - \frac{5}{2}i \end{aligned}$$


20. a) Las potencias sucesivas son:

$$z = 1 + i = (\sqrt{2})_{45^\circ} \quad z^2 = (1 + i)^2 = 2i = 2_{90^\circ} \quad z^3 = (1 + i)^3 = (2\sqrt{2})_{135^\circ}$$

$$z^4 = (1 + i)^4 = 4_{180^\circ} \quad z^5 = (1 + i)^5 = (4\sqrt{2})_{225^\circ} \quad z^6 = (1 + i)^6 = 8_{270^\circ}$$

$$z^7 = (1 + i)^7 = (8\sqrt{2})_{315^\circ} \quad z^8 = (1 + i)^8 = 16_{360^\circ}$$

Los afijos se encuentran en una espiral que se aleja del origen de coordenadas.



b) Las primeras potencias del complejo $u = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i$ son:

$$u = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i = \left(\frac{1}{2}\right)_{60^\circ}$$

$$u^2 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)_{120^\circ}$$

$$u^3 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^3 = \left(\frac{1}{8}\right)_{180^\circ}$$

$$u^4 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^4 = \left(\frac{1}{16}\right)_{240^\circ}$$


$$u^5 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^5 = \left(\frac{1}{32}\right)_{300^\circ}$$

$$u^6 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^6 = \left(\frac{1}{64}\right)_{360^\circ}$$

$$u^7 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^7 = \left(\frac{1}{128}\right)_{420^\circ}$$

$$u^8 = \left(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right)^8 = \left(\frac{1}{256}\right)_{480^\circ}$$

Los afijos se encuentran en una espiral que se acerca del origen de coordenadas.



c) Las primeras potencias del complejo $w = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ son:

$$w = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i = 1_{30^\circ}$$

$$w^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^2 = 1_{60^\circ}$$

$$w^3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^3 = 1_{90^\circ}$$

$$w^4 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^4 = 1_{120^\circ}$$


$$w^5 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^5 = 1_{150^\circ}$$

$$w^6 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^6 = 1_{180^\circ}$$

$$w^7 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^7 = 1_{210^\circ}$$

$$w^8 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^8 = 1_{240^\circ}$$

Los afijos se encuentran sobre una circunferencia de centro el origen de coordenadas y radio 1.




21. Los vértices del primer pentágono regular son:

$$2_{18^\circ}; 2_{90^\circ}; 2_{162^\circ}; 2_{234^\circ}; 2_{306^\circ}$$

Las coordenadas cartesianas de los vértices son:

$$(1,90; 0,62); (0, 2); (-1,90; 0,62); (-1,18; -1,62); (1,18; -1,62)$$




Los vértices del segundo pentágono regular son:

$$2_{36^\circ}; 2_{108^\circ}; 2_{180^\circ}; 2_{252^\circ}; 2_{324^\circ}$$

Las coordenadas cartesianas de los vértices son:

$$(1,62; 1,18); (-0,62; 1,90); (-2, 0); (-0,62; -1,90); (1,62; -1,18).$$



22. Los vértices del cuadrado son:

$$2_{90^\circ}; 2_{180^\circ}; 2_{270^\circ}; 2_{0^\circ}$$

Las coordenadas de los vértices son;

$$(0, 2); (-2, 0); (0, -2); (2, 0)$$

23. La solución queda:

- Se obtiene el número complejo girado 90° , es decir, si el número complejo tiene como afijo (a, b) obtenemos, al multiplicar por i, el número complejo de afijo (- b, a).
- Al dividir por el número complejo i, se obtiene el mismo número complejo girado 270° .

$$\frac{a + bi}{i} = b - ai. \text{ Su afijo es } (b, a).$$

24. Los vértices del cuadrado son: (3, 4); (- 4, 3); (- 3, - 4) y (4, - 3).

25. Quedaría del siguiente modo:

Sea el complejo $z = a + bi$.

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + bi} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i \Rightarrow \begin{cases} \text{Su módulo es } \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{|z|} \\ \text{Su argumento } \operatorname{tg} \alpha = \frac{-b}{a} \text{ (es el opuesto del argumento de } z) \end{cases}$$

Gráficamente el inverso de z se obtiene por una homotecia de razón $k = \frac{1}{|z|}$ y ángulo $(-\operatorname{arg} z)$.

26. Los vértices de la figura se obtienen de la siguiente expresión:


$$\sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{64_{180^\circ}} = 4_{\frac{180^\circ + 360^\circ K}{3}} = 4_{60^\circ + 120^\circ K} \Rightarrow 4_{60^\circ}; 4_{180^\circ}; 4_{300^\circ}$$

Calculamos el lado L mediante el teorema del coseno:

$$L^2 = 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \cos 120^\circ \Rightarrow L = 6,93 \text{ u.}$$

El perímetro mide $3 \cdot L = 20,78 \text{ u.}$

$$\text{El área es } A = \frac{L \cdot \frac{L \cdot \sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} L^2 = 20,78 \text{ u}^2.$$



27. La solución queda:

$$z^4 + 4 = 0 \Rightarrow z = \sqrt[4]{-4} = \sqrt[4]{4_{180^\circ}} = \sqrt[4]{2 \frac{180^\circ + 360^\circ K}{4}} = \sqrt[4]{2}_{45^\circ + 90^\circ K}$$

Los vértices son: $\sqrt{2}_{45^\circ} = 1 + i$; $\sqrt{2}_{135^\circ} = -1 + i$; $\sqrt{2}_{225^\circ} = -1 - i$; $\sqrt{2}_{315^\circ} = 1 - i$


28. Sean los complejo $(a + bi)$ y $(a - bi)$. El triángulo que se forma es el de la figura.

Para que sea equilátero se debe cumplir que $\sqrt{a^2 + b^2} = 2b$.

Para que su área sea $2\sqrt{3}$ se debe cumplir $\frac{2b \cdot a}{2} = 2\sqrt{3}$.

Resolviendo el sistema obtenemos:

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = 2b \\ ab = 2\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 3b^2 \\ ab = 2\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \pm \sqrt{6} \\ b = \pm \sqrt{2} \end{cases}$$



Los complejos son: $(\sqrt{6} + \sqrt{2}i)$ y $(\sqrt{6} - \sqrt{2}i)$ o $(-\sqrt{6} - \sqrt{2}i)$ y $(-\sqrt{6} + \sqrt{2}i)$.

29. a) Calculamos el lado L del pentágono mediante el teorema del coseno:


$$L^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 72^\circ \Rightarrow L = 2,35 \text{ u.}$$

El perímetro mide $5 \cdot L = 11,76 \text{ u.}$

Calculamos la apotema:

$$\cos 36^\circ = \frac{ap}{2} \Rightarrow ap = 2 \cdot \cos 36^\circ = 1,62 \text{ u.}$$

El área es $A = \frac{11,76 \cdot 1,62}{2} = 9,53 \text{ u}^2$




b) Calculamos el lado L del hexágono mediante el teorema del coseno:

$$L^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow L = 2 \text{ u.}$$

El perímetro mide $6 \cdot L = 12 \text{ u.}$

Calculamos la apotema:



$$\cos 30^\circ = \frac{ap}{2} \Rightarrow ap = 2 \cdot \cos 30^\circ = 1,73 \text{ u.}$$

El área es $A = \frac{12 \cdot 1,73}{2} = 10,38 \text{ u}^2$

c) Calculamos el lado L del octógono mediante el teorema del coseno:


$$L^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 45^\circ \Rightarrow L = 1,53 \text{ u.}$$

El perímetro mide $8 \cdot L = 12,25 \text{ u.}$

Calculamos la apotema:

$$\cos 22,5^\circ = \frac{ap}{2} \Rightarrow ap = 2 \cdot \cos 22,5^\circ = 1,85 \text{ u.}$$

El área es $A = \frac{12,24 \cdot 1,85}{2} = 11,32 \text{ u}^2$



ACTIVIDADES-PÁG. 153

a) Las soluciones de la ecuación $z^7 = 1$ son:

$$z^7 = 1 \Rightarrow z = \sqrt[7]{1_0} \Rightarrow z = 1_{\frac{0+2k\pi}{7}} \text{ con } k = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \text{ y } 6$$

Las siete soluciones son: $z_0 = 1_0$, $z_1 = 1_{\frac{2\pi}{7}}$, $z_2 = 1_{\frac{4\pi}{7}}$, $z_3 = 1_{\frac{6\pi}{7}}$, $z_4 = 1_{\frac{8\pi}{7}}$, $z_5 = 1_{\frac{10\pi}{7}}$, $z_6 = 1_{\frac{12\pi}{7}}$.

b) Hallamos las raíces del polinomio $z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 1$, es decir, las soluciones de la ecuación

$$z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 1 = 0.$$

Las soluciones son:

$$z = \frac{2 \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) \pm \sqrt{4 \cos^2\left(\frac{2\pi}{7}\right) - 4}}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) \pm i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) = \begin{cases} \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) = 1_{\frac{2\pi}{7}} = z_1 \\ \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) - i \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) = 1_{\frac{12\pi}{7}} = z_6 \end{cases}$$

Observamos que coinciden con las soluciones z_1 y z_6 de la ecuación $z^7 = 1$.

Los otros factores cuadráticos con coeficientes reales son:

$$(z - z_2) \cdot (z - z_5) = z^2 - (z_2 + z_5)z + z_2 \cdot z_5 = z^2 - 2z \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 1$$


$$(z - z_3) \cdot (z - z_4) = z^2 - (z_3 + z_4)z + z_3 \cdot z_4 = z^2 - 2z \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) + 1$$

c) La factorización buscada es:

$$P_7(z) = z^7 - 1 = (z - 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) + 1 \right)$$

Las siete raíces del polinomio $P_7(z) = z^7 - 1$ están situadas sobre la circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio unidad, y son los vértices de un heptágono regular.

Todo lo anterior puede verse en el dibujo.



d) Las factorizaciones de los polinomios $P_n(z) = z^n - 1$ con n impar son:

$$P_3(z) = z^3 - 1 = (z - 1) \cdot (z^2 + z + 1)$$

$$P_5(z) = z^5 - 1 = (z - 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) + 1 \right)$$

$$P_7(z) = z^7 - 1 = (z - 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) + 1 \right)$$

...

$$P_n(z) = z^n - 1 = (z - 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) + 1 \right)$$

Las factorizaciones de los polinomios $P_n(z) = z^n - 1$ con n par son:

$$P_2(z) = z^2 - 1 = (z - 1) \cdot (z + 1)$$

$$P_4(z) = z^4 - 1 = (z - 1) \cdot (z + 1) \cdot (z^2 + 1)$$

$$P_6(z) = z^6 - 1 = (z - 1) \cdot (z + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + 1 \right)$$

$$P_8(z) = z^8 - 1 = (z - 1) \cdot (z + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1 \right) \cdot (z^2 + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 1 \right)$$

...

$$P_n(z) = z^n - 1 = (z - 1) \cdot (z + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{(n-2)\pi}{n}\right) + 1 \right)$$

e) Las factorizaciones de los polinomios $Q_n(z) = z^n + 1$ con n impar son:

$$Q_3(z) = z^3 + 1 = (z + 1) \cdot (z^2 - z + 1)$$

$$Q_5(z) = z^5 + 1 = (z + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right) + 1 \right)$$

$$Q_7(z) = z^7 + 1 = (z + 1) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{5\pi}{7}\right) + 1 \right)$$

...

$$Q_n(z) = z^n + 1 = (z + 1) \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + 1 \right) \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{n}\right) + 1 \right) \dots \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{(n-2)\pi}{n}\right) + 1 \right)$$

Las factorizaciones de los polinomios $Q_n(z) = z^n + 1$ con n par son:

$$Q_2(z) = z^2 + 1$$

$$Q_4(z) = z^4 + 1 = \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 1 \right)$$

$$Q_6(z) = z^6 + 1 = \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + 1 \right)$$

$$Q_8(z) = z^8 + 1 = \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{5\pi}{8}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{7\pi}{8}\right) + 1 \right)$$

...

$$Q_n(z) = z^n + 1 = \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + 1 \right) \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{3\pi}{n}\right) + 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(z^2 - 2z \cos\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) + 1 \right)$$

f) Las raíces de los polinomios $P_n(z) = z^n - 1$ y $Q_n = z^n + 1$ están situadas sobre la circunferencia con centro en el origen de coordenadas y radio unidad, y son los vértices de polígonos regulares.

En los dibujos pueden verse las raíces de los polinomios $P_6 = z^6 - 1$ y $Q_6 = z^6 + 1$, respectivamente.

